



**NUEVO**

**CombatranXT™**

**NO HAY RETO**

**AL QUE NO SE LE MIDA**

# CombatranXT™

**HERBICIDA**

Diseñado para ganaderos que enfrentan a diario desafíos importantes y necesitan tomar las mejores decisiones para aumentar las ganancias de su finca.

### ¿Qué es CombatranXT™ ?

Es un novedoso herbicida sistémico de amplio espectro, para el control de malezas de hoja ancha en potreros. Controla malezas herbáceas, semileñosas y leñosas y es selectivo a los pastos. Su fórmula avanzada de tres ingredientes activos, lo hace un producto único, que controla desde la raíz las principales malezas que afectan la productividad de sus potreros.

### Beneficios

- Mejora la rentabilidad de la ganadería transformando los potreros.
- Recupera potreros invadidos de malezas de difícil control.
- Ahorra mano de obra, al reducir el uso de otros métodos para controlar malezas en sus potreros.
- Periodo corto de reingreso del ganado a los potreros. Banda toxicológica azul.
- No necesita mezclarse con otros herbicidas.
- Elimina malezas suaves y difíciles desde la raíz. Amplio espectro de control.

### Recomendaciones de Uso

Maleza	Dosis	Recomendaciones	P.C.	P.R.
Guayabo ( <i>psidium guajava</i> )	6.0 - 8.0 L /ha (1.5 - 2.0 % v/v)	Use la dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengan de rebrote.  PARA APLICACIONES GENERALIZADAS: Use la dosis recomendada en 400 L de agua/ha  PARA APLICACIONES LOCALIZADAS: Use la mitad de la dosis en 200L de agua	7 días** para pasto de corte o heno	0 horas***
Palma lata ( <i>Bactris guineensis</i> )	6.0 - 8.0 L /ha (1.5 - 2.0 % v/v)			
Mindaca ( <i>Mascagnia concinna</i> )	6.0 L /ha (1.5 % v/v)			
Muñeco ( <i>Cordia Collococca</i> )	4.0 - 6.0 L /ha (1.0 - 1.5 % v/v)			
Pelá ( <i>Acacia farnesiana</i> )	4.0 L /ha (1.0 % v/v)			
Flor Blanca ( <i>Melochia Parviflora</i> )	3.0 L /ha (0.75 % v/v)			
Dormidera ( <i>Mimosa pudica</i> )	2.0 L /ha (0.5 % v/v)			
Bicho ( <i>Senna obtusifolia</i> )	1,0 - 2.0 L /ha (0.25 - 0.5 % v/v)			
Escoba negra ( <i>Sida acuta</i> )	3,0 L/ha (0,75% V/V)			
Escoba blanca ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3,0 L/ha (0,75% V/V)			

**P.C. Periodo de Carencia:** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la entrada del ganado.

\*\*Este periodo de tiempo se puede incrementar de acuerdo con las prácticas de manejo de pradera.

**P.R. Periodo de Reentrada:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

\*\*\*No hay restricciones de pastoreo para animales lecheros no lactantes u otro ganado incluyendo caballos, ovejas, cabras y otros animales en el área de tratamiento.

No transfiera el ganado desde áreas tratadas (o alimentos con heno tratado) hacia áreas donde cultivos de hoja ancha sensibles puedan ser cultivadas sin permitir antes 3 días de pastoreo o el consumo de heno sin tratar. Si el ganado se transfiere en menos de 3 días. La orina y el estiércol puede contener producto que cause daño a las plantas de hoja ancha.

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Tel.: +57 1 2595900 Bogotá - Colombia.

Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua, carreteras principales, asentamientos humanos y animales o cualquier otra zona de protección especial.

CombatranXT™ Registro Nacional ICA 2217

Categoría Toxicológica III - Ligeramente peligroso - Franja azul - Cuidado