

Oxitetraciclina L.A.

TETRACICLINA

¿URGENCIA EN LA FINCA? LLAME A LA AMBULANCIA AMARILLA.



REGISTRO ICA

2303 DB

INGREDIENTE ACTIVO

Oxitetraciclina **200 mg**

PRESENTACIONES

50 ml 250 ml
100 ml 500 ml

INDICACIONES

Acción prolongada para uso en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves para el tratamiento de enfermedades infecciosas provocadas por gérmenes sensibles a oxitetraciclina. Se recomienda en anaplasmosis, leptospirosis, pasteurelosis, mastitis, metritis, neumonías, infecciones articulares, colibacilosis y otros. Puede usarse como tratamiento preventivo en Fiebre de embarque, infecciones postquirúrgicas y puerperales.

DOSIS

Bovinos: 1 ml x 10 kg. No se debe exceder de 20 ml por sitio de aplicación.

Ovinos y Caprinos: 1 ml x 10 kg. No se debe exceder de 5 ml por sitio de aplicación.

Porcinos: 1 ml x 10 kg

APLICACIÓN

Intramuscular.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

