



FICHA TÉCNICA



AEROSOL USO PECUARIO

ANTISÉPTICO Y LARVICIDA DE USO EXTERNO

REGISTRO ICA No. 2745 DB

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada 1000 ml del producto contienen:

Clorpirifos 50.0 g

(O,O-dietil O-(3, 5, 6-tricolo-2-piridil) fosforotioato)

Violeta de Genciana: 3.0 g

(hexamethyl-p-rospanilina cloruro)

Excipientes: Etanol, Propilenglicol, Aceite de pino, Aceite de citronella, gas propelente (Butano/Isobutano/Propano),

C.S.P. 1000 ml

INDICACIONES

Lepecid es un antiséptico y larvicida para uso externo, en bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caprinos y perros.

USOS

Lepecid usado de manera preventiva, desinfecta, repele moscas (causantes de miasis) y coadyuda en el proceso de cicatrización de heridas accidentales o quirúrgicas como en el caso de castraciones, curaciones de ombligo y topizaciones.

Lepecid tiene uso en tratamientos curativos de miasis, desinfecta, controla las infestaciones de larvas y coadyuda en el proceso de cicatrización. En miasis muy profundas con larvas no expuestas, es necesario extraer las larvas de la herida antes de la aplicación, para que las más profundas entren en contacto con el producto.

MODO DE EMPLEO

Dirija el orificio del atomizador hacia la superficie afectada, colocando el envase a unos 30 centímetros de distancia del animal. Luego ejerza una leve presión sobre la válvula pulverizando de arriba hacia abajo el área a tratar, así como algunos centímetros alrededor de la misma. Repetir el tratamiento de acuerdo a la gravedad de la lesión o a las instrucciones del médico veterinario.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

(Ver pictogramas)

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Dañino si se ingiere.
- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante la aplicación.

• Almacene el producto en sitio seguro retirado de los alimentos, medicinas y artículos de consumo o uso humano o animal. Consérvese en temperaturas inferiores a 35°C.

• No se almacene en casas de habitación.

• Líquido combustible. No aplique cerca de llamas.

• Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.

• No perforar ni quemar el envase. No exponga el envase al calor.

• Contenido presurizado. Prohibido su relleno.

PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE INTOXICACIÓN: RECOMENDACIÓN

OJOS: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos.

PIEL: Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar. Lave la piel con abundante agua.

INHALACIÓN: Lleve al paciente al aire fresco.

INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO VETERINARIO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE Y MUÉSTRELE EL ENVASE.

ANTÍDOTO: Sulfato de atropina.

NOTA AL MÉDICO: El ingrediente activo es un inhibidor de la colinesterasa. Trátese sintomáticamente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No vierta el contenido de este producto, ni los residuos de la mezcla en vertientes de agua, estanques o aguas continentales, ya que es altamente tóxico para los peces.

ADVERTENCIA: Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

