

Rally[™] 40WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Myclobutanil.....400 g/kg

Alfa-butil-alfa-(4-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitrilo, de formulación a 20°

INGREDIENTES ADITIVOS:c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. 2740

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road. Indianapolis, IN 46268
U.S.A.

DISTRIBUIDO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia.
Tel: (091) 259 5900

® [™] Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Rally™ 40WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RALLY™ 40 WP es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas contra una amplia gama de hongos. **RALLY™ 40 WP** se absorbe rápidamente en las hojas, protege los brotes nuevos y controla al hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección. Tiene un efecto residual de 14 a 21 días.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C. días	P.R. horas
AGUACATE	Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	40 g/200 L de agua (equivalentes a 80 gr/ha)	40	4
ARROZ	Mancha púrpura <i>Sarocladium oryzae</i>	60-80 g/ha	1	4
BANANO	Complejo de hongos de Pudrición de Corona	400 ppm i.a. para envíos de fruta con trayectos de viaje más cortos (<15 días) y 600 ppm i.a. para envíos de fruta con trayectos de viaje más largos (> 15 días)	N.A	N.A
CEBOLLA CEBOLLA LARGA CEBOLLÍN CEBOLLÍN CHINO PUERRO	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	80 g/ha	21	4
FRÍJOL ARVEJA DULCE HABICHUELA HABA CAUPÍ	Antracnosis o Mancha anillada <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	50 g/ha	30	4
UVA	Oidium o mildew polvoso <i>Uncinola necator</i>	40 g/200 L de agua (equivalentes a 80g/ha)	14	4

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.



Rally[™] 40WP

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realice la aplicación dependiendo de las condiciones ambientales y de la aparición de las enfermedades.

Para aguacate utilice un volumen de 400 L de agua/ha.

Para uva utilice la dosis de 40 g/200 L de agua, aplicado con los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de agua: 400 L/ha.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Adicione la dosis total del **RALLY[™] 40 WP** al tanque con la mitad del agua y continúe agregando agua con buena agitación para lograr la suspensión del producto.

FITOTOXICIDAD

A las dosis y forma de aplicación recomendadas no causa fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD

Si se van a realizar mezclas, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en áreas pequeñas. No es compatible con los que contengan cal.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



RallyTM 40WP

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y/O LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación, la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Manténgalo alejado del calor y las chispas

Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 28/05/2020

