

FICHA TÉCNICA



Nombre Comercial: Edo Doramectina

Antiparasitario
Doramectina 1%

Función:

Antiparasitario de amplio espectro y larga acción indicado en el tratamiento y control de parásitos internos (gastrointestinales y pulmonares) y externos (garrapatas, nuches, ácaros de la sarna, piojos, miasis gusanera) en Bovinos, Ovinos, Porcinos. Actúa más tiempo en el animal.

Composición garantizada:

Cada 100 mL contiene:
Doramectina.....1,0 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

Especies de uso:



Bovinos

Porcinos

Ovinos

No. de registro:

Registro ICA N° 8726 – MV – Colombia


Presentaciones del Producto:

50 mL, 100mL, 250mL, 500mL

Dosis:

En bovinos y ovinos 1mL / 50Kg de peso (equivalente a 200µg/Kg).

En porcinos 1mL / 33 Kg (equivalente a 300µg/Kg).



Vía de Administración / Modo de Uso:



En bovinos y ovinos: Vía subcutánea.

En porcinos: Vía intramuscular en la región del cuello.

Indicaciones:

En bovinos, ovinos y porcinos para el tratamiento del parasitismo interno y externo ocasionado por:

Bovinos: Nemátodos Gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Trichostrongylus axei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus sp.*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Trichuris sp.* (Adultos), *Nematodirus spathiger* (adultos): Nemátodos Pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos y cuarto estado larvario). Garrapatas: Ayuda al control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*. Larvas productoras de nuche: *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, (estadios parasitarios). Ácaros de la sarna: Ayuda en el control de *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis* y *Psoroptes communis var bovis*. Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*. Miasis: *Cochliomyia hominivorax* (estadios parasitarios). Como medio auxiliar para el control de piojos masticadores: *Damalinia bovis* y de la mosca de los cuernos: *Haematobia irritans*.

Ovinos: Nemátodos Gastrointestinales: *Haemonchus contortus* (adultos), *Ostertagia circumcincta* (adultos, L4, incluyendo larvas inhibidas), *Trichostrongylus axei* (adultos, L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos L4), *Trichostrongylus vitrinus* (adultos, L4), *Chabertia sp*, *Cooperia curticei* (L4), *Nematodirus sp* (adultos, L4), *Trichuris sp*, *Oesophagostomum columbianum*. Nemátodo pulmonar: *Dictyocaulus filaria*. Acaros: *Psoroptes ovis* Miasis: *Cochliomyia hominivorax*. Porcinos: Nemátodos gastrointestinales: *Hyostrogylus rubidus* (adultos y cuarto estado larvario), *Strongyloides ransomi* (adultos) *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis*. Nemátodo pulmonar: *Metastrongylus sp* (adultos). Nemátodo renal: *Stephanurus dentatus* (adultos). Acaro de la sarna: *Sarcoptes scabiei*.

Precauciones:

Se recomienda: Utilizar equipos inyectables estériles.

Utilizar agujas nuevas, preferiblemente la más corta para administración subcutánea y mantener condiciones de asepsia.

No mezclar en la misma jeringa o envase con ningún otro producto. No administrar por vía endovenosa.



En dosis mayores de 10 mL se recomienda dividir la dosis y aplicarla en dos sitios. En el sitio de aplicación puede aparecer una ligera inflamación, la que desaparece en pocos días.

No administrar a animales en mal estado.

No contaminar depósitos o corrientes de agua con el producto o sus envases, porque es altamente peligroso para peces y vida acuática.

Recuerde disponer los residuos de éste producto a través del Colector Posconsumo de Medicamentos Vencidos Veterinarios más cercano. Somos una Empresa Responsable y Comprometida con la Sociedad y el Ambiente.

Recuerde: “el envase deberá eliminarse de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”.

Tiempo de Retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 50 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas u ovejas en producción de leche para el consumo humano o la industrialización ni 60 días antes del parto. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consérvese en un lugar fresco.

Código de barras:

EDO DORAMECTINA X 50 mL: 7707240052303
EDO DORAMECTINA X 100 mL: 7707240052310
EDO DORAMECTINA X 250 mL: 7707240052327
EDO DORAMECTINA X 500 mL: 7707240052334



FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO
Noviembre 29 de 2018